



LABORATORIOS
SERVINSUMOS

Levamisol 3.2%

Solución Oral al 3.2%





LABORATORIOS
SERVINSUMOS



Levamisol, está indicado en bovinos, ovinos y caprinos, para el control del parasitismo gastrointestinal y pulmonar ocasionado por las formas maduras e inmaduras de *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi*, *Nematodirus* sp, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum* sp, *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia* sp, *Bunostomum* sp, *Neoscaris* sp.

Levamisol es activo contra la parasitosis de los porcinos, causadas por: *Ascaris suum*, *Hyostromylus* sp, *Oesophagostomum* sp y *Metastrongylus* sp.

Antiparasitario interno, vermífida de acción sistémica, para uso en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. Una sola dosis elimina parásitos gastrointestinales y pulmonares.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:

Levamisol clorhidrato 32 mg.
Excipientes c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES

Antihelmíntico de amplio espectro, efectivo para el tratamiento del parasitismo Gastrointestinal y Pulmonar ocasionado por las formas maduras e inmaduras de: *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Ostertagia circumcincta*, *Ostertagia ostertagi*, *Nematodirus* spp, *Neoscaris vitulorum*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum* spp., *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Strongyloides* spp, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia* spp, *Bunostomum* spp.

DOSIS

1 mL por 4 Kg de peso vivo.

ADMINISTRACIÓN

Oral, solo o disuelto en un poco de agua, con jeringa o con una botella.

PRECAUCIONES

Emplear con cautela en animales con alteraciones renales o hepáticas. No someter a desplazamientos largos o movimientos fuertes antes o después de la desparasitación. La utilización simultánea de compuestos nicotínicos (pirantel, morantel, dietilcarbamazina), y de inhibidores de la colineste-



LABORATORIOS
SERVINSUMOS

rasas (órgano fosforados, neostigmina), debe hacerse con precaución, ya que esas sustancias pueden potenciar los efectos tóxicos del Levamisol.

No usar en equinos. Mantener en un lugar fresco, Manténgase fuera del alcance de los niños.

PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. No usar en equinos.

PRESENTACIONES

Sachet por 30 mL.

ESPECIES



Registro ICA N° 2360 DB

www.servinsumos.cc

@Laboratorios Servinsumos S.A.

